

Sơ đồ phân bón cho cây mai

Inviato da trankhoa856325 - 20/04/2024 10:08

Việc bón phân cho cây mai không phải là một kỹ thuật đơn giản vì nó liên quan đến nhiều khía cạnh như nhu cầu dinh dưỡng của cây, môi trường sống, tình trạng sức khỏe của nó, đặc điểm của cây trồng, tuổi đời, v.v. Nếu phân bón không được áp dụng đúng cách, chất lượng và hiệu quả của phân bón cho cây sẽ không tăng lên, và đôi khi nó còn có thể dẫn đến sự phát triển mất cân bằng, đặc biệt là bệnh hoắc cho cây. Thông thường, cần xem xét giai đoạn phát triển của cây để áp dụng phân bón phù hợp. Đối với cây mai, có ba giai đoạn phát triển cơ bản mà tác động lẫn nhau qua mỗi chu kỳ phát triển:

1. Giai đoạn Phôi và Phát triển: Đây là đầu năm, thường là sau mùa Tết khi cây đã tiêu hao toàn bộ năng lượng vào việc ra hoa, hoặc đầu xuân cây mới được trồng vào chậu năm trồng, trong giai đoạn này, cây đang sinh xuất ra những lộc mới. Lúc này, cây cần một lượng dinh dưỡng đáng kể để tái sinh những cành mới, tạo ra những lộc sinh mới, do đó cần rất nhiều nitrogen để tái sinh. Đây là giai đoạn phổ biến và phát triển mạnh mẽ cho những chậu mai vàng đẹp nhất. Từ tháng Hai đến tháng Năm, phân bón hữu cơ như phân cá, bã mía, hoặc phân bón hữu cơ sinh học có thể được sử dụng, kết hợp với phân bón hóa học giàu nitrogen.

2. Giai đoạn Thời kỳ ngủ: Bắt đầu từ giữa năm, từ tháng Sáu đến tháng Chín. Đến tháng Sáu, lá của mai vàng ngừng mọc nên cây đã chín và trở nên xanh đậm, và các nụ hoa bắt đầu hình thành. Việc dinh dưỡng đúng đắn trong giai đoạn này rất quan trọng, với nhu cầu cao hơn về phosphorus. Phosphorus đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành của nụ hoa, tăng cường sức đề kháng và chất lượng của chúng. Hơn nữa, ở các vùng miền phía Nam nơi mùa mưa thường xuyên trong thời gian này, đất ẩm ướt có thể làm cho cây mai dễ mắc bệnh. Cung cấp đủ phosphorus giúp cây hấp thụ nitrogen tốt hơn, làm cho lá cây dày hơn, khỏe mạnh hơn, tăng cường khả năng chống lại bệnh tật. Việc bón quá nhiều nitrogen và thiếu phosphorus trong giai đoạn này có thể dẫn đến sự mọc mầm bệnh, rụng lá sớm và ra hoa sớm trước Tết.

https://lh7-us.googleusercontent.com/Y-YSvIT-OL4YfanOGHzlttqsavDhnrxhpAeFht5mjNluM-dkEohC0Tydk56kxVEDBShRJ_MQvapfpMWzwTgG8gzFQQYs2VfvlfgA_YaWVkwfQ-hNGvcBHxHbjniiB2Fyg_Tz6Uh7SXHLXDM90InC-PU

3. Giai đoạn Ra hoa và Thời kỳ ngủ: Từ tháng Mười trở đi trong lịch âm, nhu cầu dinh dưỡng và chăm sóc đúng cách, lá của cây mai ngừng phát triển, lá trở nên chín và rụng. Cây ngừng sinh xuất lộc mới, chuyển vào giai đoạn ra hoa. Thời kỳ nghỉ này, lá chín đóng vai trò của mình và chuyển biến rụng. Trước khi rụng, các chất dinh dưỡng trong lá chuyển vào cây, nuôi dưỡng những búp hoa đang chín. Do đó, trong giai đoạn này, cần tránh sử dụng phân bón nitơ quá mức vì nó có thể khiến cây phát triển lá mới. Khi lá mới phát triển, chúng ngăn chặn quá trình chín của búp hoa, dẫn đến việc ra hoa không đúng đầu, những bông hoa đến chất lượng và thời gian ra hoa trong mùa Tết. Để đảm bảo nụ chín đầu trong giai đoạn này, việc bổ sung kali là rất quan trọng. Kali thúc đẩy sự chín mạnh mẽ và đầu của nụ hoa, nâng cao sự ra hoa và tuổi thọ của nó.

Đặc biệt đây là một ví dụ dựa trên kinh nghiệm làm vườn để bón phân cho một cây mai được trồng trong chậu có kích thước là 0.8m, đường kính thân cây dao động từ 4-6 cm, chiều cao từ 1.5 - 1.8 m, và đường kính tán lá từ 0.8 - 1m. Cây đang phát triển tốt, không suy nhược hoặc bệnh. Để trồng đã được bổ sung thêm phân hữu cơ:

- **Lần Bón Phân Thứ Nhất:** Từ tháng Giêng đến tháng Năm: khoảng 300g bã mía (hoặc phân Dynamic, phân cá, phân hữu cơ tập trung...) ngâm trong nước tưới cho cây mai. Ngoài ra, pha trộn 30-50g phân NPK giàu nitrogen và bón đều lên đất. Trong thời kỳ này, người làm vườn thường chia lượng này thành các lần nhỏ và áp dụng chúng trong hai hoặc ba giai đoạn trong mùa mưa sớm để tránh sự sốc từ phân bón, đất rễ và đảm bảo hợp phần dinh dưỡng tốt hơn.

- **Lần Bón Phân Thứ Hai:** Từ tháng Sáu đến tháng Chín: khoảng 200g bã mía (hoặc phân Dynamic, phân cá, phân hữu cơ tập trung...) với 30-50g phân NPK giàu phosphorus (ví dụ như DAP). Áp dụng ngay lần bón phân đầu tiên, chia phân bón thành nhiều lần nhỏ để đảm bảo hợp phần tối ưu.

- **Lần Bón Phân Thứ Ba:** Từ tháng Mười trở đi, áp dụng 20-30g kali sulfate hoặc kali clorua. Ngoài ra, kali nitrat cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ cho các cây yếu và các búp hoa nhỏ hơn. Phân guano dê cũng rất tốt cho có bao nhiêu loại mai vàng vào chậu mùa vì nó chứa nhiều kali để hỗ trợ. Lưu ý rằng

việc áp dụng phân bón nên hoàn toàn ngừng lại khoảng 10-15 ngày trước khi lá rụng để ngăn chặn sự
xuất hiện của lá mới.

=====